

**Дрозд**  
*Turdus LINNAEUS, 1758*

Масса тела: 100гр  
Размер: 210см  
Продолжительность  
жизни: 5лет



**Описание.** Рябінник, или дрозд-рябінник (лат. *Turdus pilaris*), — распространённый вид европейских дроздов. Крупный дрозд, длина 25-29 см, масса 75-130 г, размах крыльев 40-46 см. Верх контрастный: шапочка, зашеек, поясница, надхвостье светло-серые, спина и крылья коричневые, хвост темный. Горло и грудь охристые, брюхо и подхвостье белые, весь низ тела густо покрыт четкими темными пестринами, сгущающимися в крупные пятна на боках шеи. Испол крыла бело-серый. Клюв желтоватый с темным кончиком. Полового диморфизма нет. Голос дрозда рябинника трудно назвать певчим. Скорее, он скрипучий и щебечущий, похожий на звуки: «чак-чик-чак», а при опасности: «ра-ра-ра». Поют они редко, могут щебетать на лету. Громко кричат при опасности, оповещая колонию и других птиц. Когда дрозды селятся возле людей, то доставляют неудобства своими шумными криками.

**Среда обитания** Населяет различные типы лиственных, смешанных и хвойных лесов. Его можно встретить и в березовых рощах с еловым подростом, и в чистых высокоствольных сосняках, и в старых дубравах. Предпочитает птица светлые, разреженные участки леса, часто расположенные возле прогалин и полей, вырубок и опушек. Рябінник населяет лесную зону Европы и Сибири на восток до Алдана. В Европе гнездится к востоку от Швейцарии, Восточной Баварии, Гессена и Ганновера, северная граница проходит через Скандинавию,

Кольский пов, Северный Урал, лесную зону Таймыра. На восток прослежен до Алдана. Южная граница проходит по Забайкалью, Алтаю, северным частям Казахстана, далее через Саратов, Воронеж, Полтаву. Зимует в Средней и Южной Европе, в Крыму, на Кавказе, в южных частях Средней Азии, к югу до Алжира, Нубии, Сирии, Пакистана и Китая.

**Питание.** Рябінники - всеядные птицы. Летом их основной рацион составляют беспозвоночные: дождевые черви, насекомые, пауки, многоножки, моллюски и т.д. Едят и растительную пищу. Зимой переходят на ягоды и плоды, оставшиеся на деревьях. Северные популяции рябінников - настоящие перелетные птицы. Живущие южнее собираются в стаи и кочуют в поисках корма. Если в окрестностях не оказывается рябины, диких яблонь и других деревьев, кочуют на большие расстояния. Часто посещают парки и скверы в городах, где могут встречаться в огромных количествах. Иногда кормятся вместе со стаями свиристелей.. Весьма непритворлив в выборе гнездовых местообитаний.

**Размножение.** Весьма непритворлив в выборе гнездовых местообитаний. Сезон размножения наступает уже в апреле. Обычно гнездится колониями разной плотности и размеров, иногда на одном дереве бывает несколько гнезд на разной высоте). Гнездо у рябінников строит самка. Самец при этом сопровождает, охраняет ее и место гнездования. Гнездовой материал

самка, по возможности, собирает поблизости от гнезда. В теплую и сухую погоду строительство гнезд идет очень быстро. Однако в тех случаях, когда дрозды сооружают особо толстую глиняную прокладку, что чаще случается в более ветреных, холодных и дождливых районах или в годы с подобными условиями, строительство гнезда затягивается на 7-10 дней и после завершения, птицы просушивают его еще несколько дней. В северных районах рябінники строят самые тяжелые гнезда с особенно толстой прослойкой глины. В теплые и от носитель но сухие годы (или в таких районах)количество глины может значительно сокращаться и тогда гнездо возводится очень быстро - в течение 2-4, а иногда даже и 1 дня. Иногда пара гнездится в прошлогодней постройке (обычно не своей), слегка ее подновляя, либо использует ее в качестве фундамента для нового гнезда. Гнездо типично для представителей рода, но обычно в лотке имеется скудная выстилка из травы. Яйца зеленоватые или голубоватые, с равномерным густым ржавчатым крапом. , время их насиживания около 12 дней. Птенцы остаются в гнезде примерно 2 недели. В сезоне бывает 1-2 выводка. У гнезда птицы очень беспокойны и крикливы.