

Масса тела: 160гр
Размер: 32-37см
Продолжительность
жизни: 8 лет



Сойка – среднего размера птица с запоминающимся оперением и громким пронзительным криком. Ее латинское название, связано со словами «шумный», «болтливый». Род соек включает в себя восемь видов и более сорока пвидов, которые отличаются друг от друга различными видами оперения. Латинское имя — *Garrulus glandarius* ей присвоено в 1758 году Карлом Линнеем. Если первое слово в названии говорит о том, что птица характерна шумными криками, то второе идет от латинского *glandis*, что означает желудь и подчеркивает ее пищевые предпочтения.

По весу птицы не превышают 200 г, но выглядят внушительнее, за счет длинного хвоста и крупной головы. Длина пернатого, учитывая хвост, может достигать 400 мм, но в среднем — 330 мм, при росте около 150 мм. Крепкий клюв, который способен раскалывать дубовые желуди, орехи и др. плотные семена, черного цвета. Он относительно небольшой, но крепкий, его размер от ноздрей в среднем 33 мм.

Эти воробьиные широко распространены по всей Европе, а также в Марокко и Алжире, ареал простирается на восток за Урал и север Ближнего Востока, через Азербайджан и Монголию в Китай, Корею и Японию. В России они водятся по всей территории, где есть леса, с европейской части, до дальневосточных берегов, есть на Курилах и Сахалине, кроме зоны влажных субтропиков. Кроме Евразии, пернатые встречаются в Северной Америке. Обитают в лесах всех видов, особенно буковых и грабовых, но дубовые являются предпочтительными, также встречаются в парках, в больших фруктовых садах. В северных регионах и в Сибири селятся в березовых рощах и хвойных лесах. Это всеядные птицы и их рацион зависит от времени года. Из живых организмов она охотится на разных насекомых, может поймать лягушку или ящерицу, поедать улиток и моллюсков. Пернатые нападают на мелких грызунов и птиц, разоряют гнезда, поедая яйца и птенцов.

Если в более теплое время года в их желудках встречается больше животной пищи, то в холодное время, это растительный корм. Основной едой у этого представителя врановых в широколиственных и смешанных лесах евразийского и североамериканского регионов являются дубовые желуди. Давно замечена корреляция, между численностью этих птиц и урожаями желудей, проживанием этих пернатых в регионе и наличием дубов. Пернатые, в незначительных количествах, не причиняя особый вред урожаю, питаются: овсом; подсолнечником; пшеницей; кукурузой; бобовыми. Лакомятся они иногда: малиной; брусникой; земляникой; черемухой; рябиной. Из насекомых-вредителей в ее меню входят: золотистые бронзовки; майские жуки; долгоносики; жуки-усачи; непарный и сосновый шелкопряд; личинки пилильщика; листогрызы.